



L'ASSOCIAZIONE PICCHIO VERDE ONLUS ORGANIZZA LA

2[^] NOTTE EUROPEA DELLA CIVETTA BANINA 28 MARZO

ORE 20.30

RITROVO DAVANTI AL CASTELLO
San Colombano al Lambro (Mi)

CI RECHIAMO NELL'OASI E NEL PARCO PER ASCOLTARE I CANTI
DEI RAPACI NOTTURNI: CIVETTA, ASSIOLO, ALLOCCO,
BARBAGIANNI, GUFO

Percorso nell'Oasi: Cà del Mazza, Costa dei Tassi.

Percorso nel Parco: Roverone, Valbissera, Campo del Fico, Cà del Lupo

è necessario portare le auto per formare equipaggi di 4/5 persone
vestiti adatti alla nottata di luna nuova
rientro previsto intorno a mezzanotte
in caso di pioggia l'iniziativa è rimandata al 4 aprile

per info picchio verde onlus maurizio papetti 3405688621 giovanni leporelli 3207521336
oasiparcobanino@yahoo.it www.ziopapes.it/picchio_verde/picchio.htm



RAPACI NOTTURNI, FAMIGLIA DEGLI STRIGIDI



CIVETTA, ATHENE NOCTUA La civetta è lunga circa 21 cm, ha un'apertura alare di 53-59 cm e un peso che varia da 100 a poco più di 200 grammi. E' tozze, capo largo e appiattito, non ha i tipici ciuffi auricolari del gufo; gli occhi sono gialli. La parte superiore è grigio-bruno macchiata di bianco, quella inferiore è prevalente il bianco, macchiato di bruno.

Habitat In Italia è un uccello molto comune. Vive nelle vicinanze degli abitati civili, dove c'è presenza umana, in zona collinare.

Abitudini E' un uccello notturno ma può essere attiva anche nel tardo pomeriggio e di prima mattina.

Alimentazione La civetta si nutre di piccoli mammiferi, uccelli, anfibi, insetti.

Riproduzione Nidifica tra Marzo e Giugno. Depone 2-5 uova bianche e le cova per circa 4 settimane. E' aiutata dal maschio nella caccia. Dopo un mese o poco più i piccoli lasciano il nido ma sono completamente indipendenti solo a 2-3 mesi di vita.



ASSIOLO, OTUS SCOPS L'aspetto è simile ai gufi, ma l'impressione delle proporzioni e delle dimensioni dipende dalla posizione delle orecchie pelose. Possono sembrare più grandi se hanno le orecchie rialzate. Sono di color che va dal grigio al marrone castagna con chiazze bianche evidenti. Gli occhi hanno un'iride arancione tendente al giallo. Nella parte inferiore del corpo si trovano strisce nere che colpiscono.

Habitat In Italia sono diffusi a macchia di leopardo.

Atteggimento e covata L'assiolo è un uccello attivo di notte. Raggiunge il culmine prima di mezzanotte. Tra le 0 e le 2 è in pausa. All'alba si ritira nel suo rifugio. Durante la cova i maschi e le femmine non usano lo stesso albero per dormire. Durante la cova è compito del maschio controllare la covata. Gli uccelli sono maturi a 10 mesi.

Nutrimento L'assiolo è soprattutto un cacciatore di insetti: cicale, cavallette e maggiolini sono le sue prede. Mangia anche lombrichi, raramente mangia uccelli, rospi e topi.

Migrazione Sono migratori, cominciano dalla metà di agosto e a fine settembre la migrazione è conclusa.



GUFO COMUNE, ASIO OTUS Il gufo comune è più snello dell'allocco, questo rapace è alto 36 cm ed è munito di lunghi ciuffi, ha un piumaggio bruno macchiettato. I tipici ciuffi sulle orecchie non hanno nulla a che vedere con l'apparato uditivo. È un animale notturno; caccia una grande varietà di piccoli animali, topi, talpe, ratti, uccelli e insetti. Di giorno dorme sugli alberi.

Nidifica tra marzo e maggio. La femmina depone 3-10 uova nel nido di un'altra specie o in quello di uno scoiattolo oppure depone le uova sul suolo o sotto un albero. Cova per 26-28 giorni. Il maschio nutre la femmina. I piccoli lasciano il nido dopo 3-4 settimane.

Alcuni gufi delle zone settentrionali migrano durante l'inverno verso il sud (Messico, Egitto, India) ritornando nella loro abituale zona di diffusione la primavera successiva.